

## Ból neuropatyczny i migrenowy

1. Wskaż koanalgetyki najskuteczniejsze w leczeniu bólu o charakterze neuropatycznym:

- 1) drotaweryna;
- 2) pregabalina
- 3) duloksetyna;
- 4) klonazepam;
- 5) bisfosfoniany.

Prawidłowa odpowiedź to:

- A. 1,2,3.
- B. 1,2,4.
- C. 1,4,5.
- D. 2,3,4.**
- E. 2,3,5.

2. W bólu o charakterze „palenia, pieczenia i przechodzenia prądu elektrycznego” u pacjenta z nowotworem najbardziej właściwą opcją terapeutyczną jest:

- A. kodeina.
- B. fentanyl
- C. morfina.
- D. oksykodon.
- E. oksykodon w połączeniu z lekiem przeciwpadaczkowym.**

3. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi farmakoterapii bólu, do oceny bólu neuropatycznego zaleca się stosowanie:

- A. skali numerycznej NHS.
- B. Krótkiego Inwentarza Bólu.
- C. skali DN4.**
- D. skali Doloplus.
- E. kwestionariusza Melzacka.

4. Do adjuwantów analgetycznych (koanalgetyków) należą:

- 1) glikokortykosteroidy;
- 2) antagoniści receptora NMDA (N-Metylo D-Asparaginowego);
- 3) kanabinoidy;
- 4) leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina, duloksetyna);
- 5) leki przeciwpadaczkowe (np. gabapentyna, pregabalina)

Prawidłowa odpowiedź to:

- A. 4 i 5.
- B. 3, 4, 5.
- C. 3 i 5.
- D. 1, 4, 5.
- E. wszystkie wymienione.**

5. Do koanalgetyków nie należy/ą:

- A. bisfosfoniany.
- B. deksametazon.
- C. morfina.**
- D. leki przeciwdrgawkowe.
- E. leki przeciwdepresyjne.