

Program szczepień ochronnych na Ukrainie (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11>)

Вік / wiek	Щеплення проти	Szczepionka
1 день / 1 doba	Гепатиту В	WZW B 1 dawka
3-5 днів / 3-5 doba	Туберкульозу	Gruźlica (BCG) 1 dawka
2 місяці / 2 miesiąc	Гепатиту В	WZW B 2 dawka
	Дифтерії, кашлюка, правця	Błonica, tężec, krztusiec 1 dawka
	Поліомієліту	Polio (IPV) 1 dawka
	Гемофільної інфекції	HiB 1 dawka
4 місяці / 4 miesiąc	Дифтерії, кашлюка, правця	Błonica, tężec, krztusiec 2 dawka
	Поліомієліту	Polio (IPV) 2 dawka
	Гемофільної інфекції	HiB 2 dawka
6 місяців / 6 miesiąc	Гепатиту В	WZW B 3 dawka
	Дифтерії, кашлюка, правця	Błonica, tężec, krztusiec 3 dawka
	Поліомієліту	Polio (OPV) 3 dawka
12 місяців / 12 miesiąc	Гемофільної інфекції	HiB 3 dawka
	Кору, краснухи, паротиту-	MMR 1 dawka
18 місяців / 18 miesiąc	Дифтерії, кашлюка, правця	Błonica, tężec, krztusiec 4 dawka
	Поліомієліту	Polio (OPV) 4 dawka
6 років / 6 lat	Дифтерії, правця	Błonica, tężec 5 dawka
	Поліомієліту	Polio (OPV) 5 dawka
	Кору, краснухи, паротиту	MMR 2 dawka
14 років / 14 lat	Поліомієліту	Polio (OPV) 6 dawka
16 років	Дифтерії, правця	Błonica, tężec 6 dawka
26 років	Дифтерії, правця (надалі - кожні 10 років)	Błonica, tężec 7 dawka (i potem co 10 lat)

BCG (БЦЖ)

Szczepienie BCG jest wykonywane najwcześniej 48 godzin po urodzeniu, zwykle w 3-5 dobie. Wcześniaki są szczepione, gdy osiągną masę ciała 2500 g. Szczepienia BCG nie łączy się z innymi szczepieniami w tym samym dniu.

WZW B (гепатиту В)

Zwykły schemat to 0-2-6 miesiąc. Jeśli wykorzystywane są szczepienia skojarzone to zalecane są schematy 2-4-6-18 miesięcy lub 2-4-9 miesięcy. Noworodki o masie ciała <2000 g należy zaszczyć gdy osiągną masę 2000 g lub ukończą pierwszy miesiąc życia. Jeśli noworodek jest w ciężkim stanie, to należy go zaszczyć przed wypisaniem ze szpitala. Jeśli matka miała pozytywny HBsAg to noworodka szczepi się niezależnie od masy ciała i podaje immunoglobulinę, a szczepienie nie liczy się jako pierwsza dawka – należy później podać trzy dawki w schemacie 0-1-6.

Блѳона, тѳзес і кртусіес (дифтерії, кашлюка, правця)

Można używać zarówno szczepionki z pełnokomórkową (AKDP), jak i bezkomórkową (AAKDP) komponentą krztuśca. Krztusiec w wywiadzie nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. W wieku co najmniej 6 lat podaje się szczepienia bez krztuśca zawierające sam toksoid błoniczy i tѳcowy (ADP), a w wieku 16 lat toksoid błoniczy i tѳcowy ze zmniejszoną zawartością antygenu (ADP-M)

Polio (поліомієліту)

Pierwsze dwa szczepienia wykonuje się szczepionką IPV, a następne szczepionką OPV, chyba że są przeciwwskazania do szczepionki OPV wszystkie szczepienia wykonuje się szczepionką IPV. Szczepionkę IPV można podawać osobno albo jako składnik szczepionek skojarzonych.

HiB (Haemophilus influenzae typu b)

Szczepionkę można podawać osobno lub jako składnik szczepionek skojarzonych.

MMR (кору, епідемічного паротиту)

Przebycie którejs z tych chorób nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia.

Uzupełnianie brakującej dawek – minimalne odstępy

Dzieci w wieku od 3 miesięcy do ukończenia 7 roku życia

Szczepionki		Minimalny odstęp			
		1-2 dawka	2-3 dawka	3-4 dawka	4-5 dawka
AKDP, ADP (DTP, DT)	Do 1 roku	4 tygodnie	4 tygodnie	Według kalendarza	Według kalendarza
	>1 roku	4 tygodnie	6 miesięcy	Według kalendarza, o ile odstęp między pierwszym szczepieniem, a ponownym z kalendarza wynosi co najmniej 1 rok	Według kalendarza, ale nie wcześniej niż 1 rok
Polio		1 miesiąc	1 miesiąc	6 miesięcy	
WZW B		1 miesiąc	1 miesiąc		
MMR		1 miesiąc			
HiB		1 miesiąc, nie podaje się drugiej dawki, jeśli pierwszą podano pomiędzy 12 m.ż., a przed 5 r.ż.	6 miesięcy, nie podaje się trzeciej dawki, jeśli drugą podano pomiędzy 12 m.ż., a przed 5 r.ż.		

Dzieci w wieku od 7 lat do ukończenia 18 roku życia

Szczepionki	Minimalny odstęp		
	1-2 dawka	2-3 dawka	Ponowne szczepienie
ADP-M (Td)	4 tygodnie	6 miesięcy	Co 10 lat albo według kalendarza, ale nie wcześniej niż 1 rok
MMR	1 miesiąc		
WZW B	1 miesiąc	1 miesiąc	
Polio	1 miesiąc	1 miesiąc	6 miesięcy