

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 – DRUGA DAWKA



CZY TO PRAWDA, ŻE PO DRUGIEJ DAWCE WIĘCEJ OSÓB ŹLE SIĘ CZUJE NIŻ PO PIERWSZEJ?

Reakcja na szczepienie jest indywidualnie zmienna.

Zdecydowana większość szczepionych nie ma żadnych objawów po szczepieniu, u części osób mogą pojawić się dolegliwości po pierwszej lub drugiej dawce. Nie ma tu jednoznacznych zależności, choć można zaobserwować, że w przypadku szczepionek mRNA ewentualne dolegliwości częściej dotyczą drugiej dawki, a w przypadku szczepionek wektorowych – pierwszej dawki.

JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE OBJAWY POSZCZEPIENNE PO DRUGIEJ DAWCE?

Objawy po 2. dawce szczepienia mogą być takie same jak w przypadku 1. dawki czyli np.:

- **ból/zaczerwienienie/obrzęk w miejscu wkłucia,**
- **osłabienie,**
- **stany podgorączkowe,**
- **dreszcze,**
- **bóle głowy.**

Jednak odpowiedź na szczepienie jest indywidualna, a rodzaj/nasilenie objawów u każdego pacjenta mogą być różne.

JAKIE LEKI MOŻNA PRZYJAĆ, JEŚLI PO DRUGIEJ DAWCE WYSTĄPI BÓL, GORĄCZKA?

W przypadku występowania działań niepożądanych takich jak bóle mięśniowe, stany podgorączkowe, złe samopoczucie **możliwe jest przyjęcie zarówno paracetamolu (np. Panadol), jak i niesteroidowego leku przeciwzapalnego – np. ibuprofenu (np. Nurofen).** Nie zaleca się przyjmowania tych leków przed szczepieniem „na wszelki wypadek”.



CZY PRZED DRUGĄ DAWKĄ BRAĆ PROFILAKTYCZNIE LEKI PRZECIWBÓLOWE/PRZECIWPALNE?

Nie zaleca się profilaktycznego przyjmowania leków przeciwbólowych/przeciwzapalnych w związku ze szczepieniem.

CZY OSOBY REZYGNUJĄCE Z DRUGIEJ DAWKI SZCZEPIENIA MOGĄ SIĘ CZUĆ BEZPIECZNIE?

Zaszczepienie tylko jedną dawką w przypadku szczepionek dwudawkowych nie daje pełnej odporności. Niepełne szczepienie nie chroni też wystarczająco przed nowymi wariantami wirusa. Tylko pełny schemat szczepienia zapewnia wysoką ochronę przed zachorowaniem.

CZY MOŻLIWE JEST UKOŃCZENIE SCHEMATU SZCZEPIENIA INNYM PREPARATEM?

Zgodnie z charakterystykami produktów leczniczych (ChPL) szczepionek oraz obecnie obowiązującymi w Polsce zaleceniami, **rozpoczęty schemat powinien być zakończony tym samym preparatem.** Trwają obecnie badania dotyczące mieszanych schematów szczepienia i kiedy poznamy ich wyniki, być może nastąpi zmiana zapisów ChPL i zmiana zaleceń.

JAKIE SĄ W TEJ CHWILI ZALECANE ODSTĘPY POMIĘDZY DAWKAMI POSZCZEGÓLNYCH PREPARATÓW?

Na dzień dzisiejszy zalecane odstępy pomiędzy dawkami poszczególnych preparatów wynoszą:

- Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 21 dni (nie dłużej niż 42 dni)
- Moderna 28 dni (nie dłużej niż 42 dni)
- Vaxzevria AstraZeneca od 35 dni (nie krócej niż 28 i nie dłużej niż 84 dni od pierwszej dawki)

