



Minister Zdrowia

Warszawa,

ZPŚ.641.293.2022.JK

**Komunikat nr 30 Ministra Zdrowia
w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dzieci w wieku 6 mc - 4 lata**

Minister Zdrowia informuje, że na podstawie zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 25.10.2022 r. wraz ze zmianą w rejestracji szczepionki **Comirnaty (Pfizer-BioNTech)** od **12 grudnia 2022 r.** rozpoczną się szczepienia **w grupie dzieci 6 mc - 4 lata.**

Szczepienie przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień u dzieci w wieku 6 mc – 4 lata będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej - 3 mikrogramy/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej), która została dopuszczona do obrotu po ocenie w Europejskiej Agencji Leków, ze wskazaniami ochrony przed objawami COVID-19 wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2.

Schemat szczepienia jest trzydawkowy i obejmuje podanie dwóch dawek w odstępie 3 tygodni oraz dawki trzeciej podawanej ≥ 8 tygodni po drugiej.

Dla uzyskania najlepszej ochrony ważne jest podanie dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci 6 mc – 4 lata decyduje każdorazowo lekarz.

Informacje dodatkowe

- Skierowanie na szczepienie jest wystawiane automatycznie przez system od dnia 12.12.2022 r. z chwilą ukończenia przez dziecko 6 mc;
- Do 12.12.2022 r. punkty szczepień powinny wystawić dedykowane terminy zewnętrzne w e-rejestracji (oznaczone: kwalifikacja lekarska oraz Pfizer 3 mcg – na tak oznaczone terminy możliwe jest zapisanie dzieci z grupy 6 mc – 4 lata, kolor terminu jest spójny z kolorem wieczka fiołki). Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie: infolinia 989, mojeIKP (z poziomu konta rodzica, który ma przypisane konto dziecka w IKP) oraz punkty szczepień.

- Aby prawidłowo zarejestrować szczepienie przeciw COVID-19 należy posługiwać się niniejszą numeracją dawek w cyklu podstawowym: 1/3, 2/3, 3/3;
- Obowiązkowy wpis w Karcie szczepień nie wymaga powielenia w karcie uodpornienia dziecka. Punkt szczepień nie wystawiania dodatkowych zaświadczeń o wykonanym szczepieniu przeciw COVID-19 celem przedłożenia lekarzowi POZ;
- Informacje o wolnych terminach w punktach szczepień wykonujących szczepienia dzieci widoczne będą w e-rejestracji;
- W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając wiek dziecka (ukończony 6 mc życia);
- Kwalifikację do szczepienia dzieci 6 mc - 4 lata wykonuje lekarz, również lekarz stażysta i lekarz rezydent, zgodnie z zasadami ogólnymi przyjętymi dla szczepień przeciw COVID-19;
- Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 6 mc - 4 lata stosowany jest Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 mc – 4 lata przeciw COVID-19 dostępny na stronie <https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19>;
- Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 6 mc – 4 lata będą realizowane preparatem Comirnaty w dawce 3 µg (podmiot odpowiedzialny BioNTech Manufacturing GmbH, reprezentowany w Polsce przez Pfizer Polska Sp. z o.o.), który został dopuszczony do obrotu w procedurze warunkowej po ocenie w Europejskiej Agencji Leków, ze wskazaniami ochrony przed objawami COVID-19 wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2 u dzieci w wieku 6 mc – 4 lata. Zaleca się podanie drugiej dawki po upływie 3 tygodni od podania pierwszej dawki, a następnie trzeciej dawki co najmniej 8 tygodni po drugiej;
- Jeżeli pomiędzy kolejnymi dawkami cyklu szczepienia dziecko ukończy 5 lat, powinno dokończyć szczepienie dawką 3 mikrogramy (0,2 ml);
- W przypadku dzieci w wieku 6 mc - 4 lata z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat szczepienia obejmuje trzy dawki i nie wymaga podania dawki dodatkowej;
- W przypadku, gdy w czasie kwalifikacji do szczepienia przeprowadzony przez lekarza wywiad nie ujawnia objawów alarmowych, a dziecko wygląda na zdrowe i a stan ogólny dziecka jest dobry możliwe jest także zastosowanie przesiewowego badania przedmiotowego ograniczonego do: pomiaru temperatury ciała (metodą bezdotykową), oglądania skóry (wykwity) i oceny układu oddechowego;
- W przypadku chorych przewlekle zaleca się badanie przedmiotowe rozszerzone o sprawdzenie tych objawów, które mogą wskazywać na zaostrzenie choroby

podstawowej;

- U niemowląt w wieku od 6 mc do mniej niż 12 mc zalecanym miejscem wstrzyknięcia jest przednio-boczna strona uda. U dzieci w wieku od 1 roku zalecane miejsce wstrzyknięcia to przednio-boczna strona uda lub mięsień naramienny;
- Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 6 mc – 4 lata mogą być podawane w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu, albo jednocześnie (tylko w różne okolice ciała) z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych;
- Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem szczepionki;
- UCC w zakresie UE będzie wystawiany dla dziecka w pełni zaszczepionego na dotychczasowych zasadach;
- Zgłaszanie działań niepożądanych:

Niepożądany Odczyn Poszczepienny zgłasza lekarz za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na portalu: gabinet.gov.pl.

Niepożądane działania po szczepieniu należy zgłaszać do:

- lekarza,
- Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>
- Podmiotu odpowiedzialnego.

Z poważaniem

Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik do komunikatu nr 30

Zasady szczepień w grupie 6 mc -4 lata

SCHEMAT PODSTAWOWY				
cykl trzydawkowy preparat pediatryczny	wiek pacjenta	dopuszczone preparaty	preparat i dawka kończąca cykl szczepienia	odstęp w dniach
Pfizer (3/3)	Ukończony 6 mc życia do ukończenia 4 r.ż.	Pfizer dawka 3 µg	Pfizer dawka 3 µg	2 dawka – 21 3 dawka – 56