

CZY NADMIERNIE POLEGASZ NA LEKU DORAŻNYM W NIEBIESKIM INHALATORZE?




Korzystanie z inhalatora z lekiem dorażnym 3 razy w tygodniu lub częściej z powodu astmy może oznaczać, że za bardzo na nim polegasz i możesz być narażony na zwiększone ryzyko napadów astmy.¹ Jeśli regularnie potrzebujesz korzystać z leku łagodzącego objawy astmy zrób Test nadmiernego polegania na leku dorażnym na www.stosujrozwaznie.pl i porozmawiaj ze swoim lekarzem na temat innych możliwości leczenia.

Zrób test. Unikaj ryzyka związanego z nadmiernym poleganiem na leku dorażnym.

Materiał wyprodukowany i sfinansowany przez AstraZeneca.

AstraZeneca 

 Polska Federacja
Stowarzyszeń Chorych
na Astmę, Alergię i POChP

 PATRONAT
PTA
Polskie Towarzystwo
Alergologii i Pneumologii

 POLSKIE TOWARZYSTWO
MEDYCYNY RODZINNEJ

1. Global Initiative for Asthma (GINA). Pocket guide for asthma management and prevention (for adults and children older than 5 years). Dostęp: <http://www.ginasthma.org/>

RESP/21/03/20_npr

To nie jest porada medyczna. NIE przerywaj leczenia ani nie zmieniaj leków na astmę bez konsultacji z lekarzem.